

Kat

Basisvaccinaties

Kattenziekte (Panleukopenie)

De katteziekte is een zeer besmettelijke virusaandoening die hoge sterfte veroorzaakt. Typische symptomen zijn: lusteloosheid, koorts, braken en diarree. Ook het beenmerg en de lymfeklieren kunnen aangetast worden, waardoor een verminderde afweer ontstaat en andere infectieziekten het ziektebeeld kunnen verergeren. Virusinfectie bij drachtige katten kan leiden tot kittens met hersenafwijkingen.

Niesziekte

De niesziekte is een luchtwegaandoening waarbij meerdere ziekteverwekkers een rol spelen (caliciviris, kattenherpesvirus, Bordetella bronchiceptica, Chlamydia). De voornaamste symptomen zijn niezen, neusvloeit, tranende ogen, koorts, soms pijnlijke zweren in de mond waardoor de kat slecht kan eten. Katten die herstellen van kattenniesziekte blijven frequent drager van de virussen en blijven deze verspreiden.

Optionele vaccinaties

Kattenleucose

Katteleucose is is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij de kat. Het leucemievirus verspreidt zich door onderling contact tussen katten. Een kat heeft 6 kansen op 10 om door het virus besmet te worden. De tijd tussen infectie en het ontstaan van de ziekte kan soms jaren duren. Een besmette kat lijkt dus perfect gezond maar kan levenslang drager blijven en vormt een groot gevaar voor andere katten. Bij een besmette kat kan op zekere dag de ziekte plots uitbreken, dikwijls met de dood als gevolg. De ziekte tekens zijn zeer uiteenlopend: tumoren, bloedarmoede, diarree, ... De dierenarts kan met behulp van een bloedonderzoek een diagnose stellen.

Hondsdolheid (rabiës)

Hondsdolheid is altijd dodelijk en is ook gevaarlijk voor de mens. Vaccinatie is verplicht ten zuiden van Samber en Maas en voor katten die mee op reis gaan naar het buitenland.

Wij raden volgend vaccinatieschema aan:

Op 9 weken leeftijd	Kattenziekte + Niesziekte (evt. Leukose)
Op 12 weken leeftijd	Kattenziekte + Niesziekte (evt. Leukose)
Nadien jaarlijks herhalen	Kattenziekte + Niesziekte (evt. Leukose)